

LES TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX DE LA FA

Si l'épisode de fibrillation auriculaire est bref, peu symptomatique et qu'il n'existe aucun risque de formation de caillots, le médecin peut estimer qu'aucun traitement n'est nécessaire.

Il convient cependant d'adopter une bonne hygiène de vie pour limiter le risque cardiovasculaire.

Si un traitement médicamenteux est nécessaire :

- Pour éviter la formation de sang dans le cœur, il faut prendre un **traitement anticoagulant**.

TOUS LES JOURS ET A HEURE FIXE !

Il existe deux classes de médicaments à prendre par voie orale qui empêchent la coagulation :

- les antivitamines K ou AVK (Coumadine®, Previscan®, Sintrom®)
- les anticoagulants oraux directs (Eliquis®, Pradaxa®, Xarelto®)

Ce traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis de son médecin.


Le risque lors de la prise d'anticoagulants est la survenue d'hémorragies. En cas de saignement sous anticoagulants, un avis médical est nécessaire.

- Pour normaliser le rythme cardiaque, des « anti-arythmiques » peuvent être donnés.

Les médicaments les plus utilisés sont les bêtabloquants (qui se terminent par -lol). Parfois, d'autres médicaments sont prescrits (amiodarone, flécaïnide, digoxine).




LA FIBRILLATION AURICULAIRE (FA)




Service d'éducation thérapeutique -
programme polypathologies

LE CŒUR

Le cœur est le « moteur » de l'organisme. Il est constitué de quatre compartiments : deux oreillettes et deux ventricules. Les oreillettes se contractent en même temps, afin de faire passer le sang dans les ventricules. Ceux-ci se contractent ensuite pour envoyer le sang à travers tous les vaisseaux sanguins du corps.



En temps normal, les battements du cœur sont réguliers. En cas de fibrillation auriculaire (FA), ils sont irréguliers. Cela peut se manifester par des troubles du rythme (= des arythmies) ou une accélération du rythme cardiaque.



LES SYMPTÔMES DE LA FA

Dans 30% des cas, la FA ne cause aucun symptôme. Lorsqu'ils surviennent, les symptômes sont :

- Des palpitations
- Une capacité d'effort limitée marquée par un essoufflement
- Des douleurs thoraciques
- Des états d'anxiété
- Une transpiration anormale
- Des vertiges




Il est important d'informer son médecin ou son pharmacien en cas de modification de son état général.

LES COMPLICATIONS DE LA FA

Lorsque le cœur bat de manière irrégulière, le sang peut stagner au niveau du cœur et former des caillots.


Les caillots peuvent se détacher et se déplacer vers les artères cérébrales, ce qui peut provoquer un accident vasculaire cérébral (AVC).



En cas de signes d'AVC, il faut agir **V-I-T-E** :



Visage :
le visage est-il
affaissé ?



Incapacité :
la personne
peut-elle lever
les deux bras
normalement ?



Troubles de la parole :
la personne
a-t-elle des
difficultés à parler ?



Extrême urgence :
appelez le 15 ou allez
rapidement aux
Urgences