

MON ANTIAGREGANT PLAQUETTAIRE




Cette plaquette a été réalisée à visée informative pour les patients.
Pour toute(s) question(s), se référer à votre neurologue ou à votre
médecin traitant.

Pourquoi ce traitement et comment fonctionne-t'il ?

Suite à votre AVC, il vous a été prescrit un antiagrégant plaquettaire.

Ce médicament empêche les plaquettes de s'agréger entre elles. En effet, l'agrégation des plaquettes contribue à la formation d'un caillot sanguin. Ainsi, la prise de ce médicament limite la formation de caillot et donc le risque de récurrence d'AVC (cf schéma ci-contre).



Parmi les antiagrégants plaquettaires existants, le vôtre est coché dans la liste ci-dessous :

- ☐ **Aspirine : KARDEGIC, RESITUNE, ASPIRINE PROTECT**
- ☐ **Clopidogrel : PLAVIX**

Remarque : L'aspirine est un médicament qui peut aussi être utilisé comme antalgique ou anti-inflammatoire. Cependant, à dose plus faible il s'agit d'un antiagrégant plaquettaire.

Comment le prendre ?

Les antiagrégants sont des médicaments à prendre par voie orale, **tous les jours, à heure fixe.**

	Aspirine	Clopidogrel PLAVIX
Dosages	KARDEGIC : 75 ou 160 mg RESITUNE : 75 ou 100 mg ASPIRINE PROTECT : 100 mg	75 mg
Posologie	KARDEGIC : 1 sachet par jour RESITUNE et ASPIRINE PROTECT : 1 comprimé par jour	1 comprimé par jour
Modalités de prise	Verser le contenu du sachet dans un grand verre, ajouter de l'eau et mélanger jusqu'à obtenir une dissolution complète	En cas de besoin, le clopidogrel peut être écrasé

Que faire en cas d'oubli de prise ?



Prendre correctement et régulièrement son traitement permet de limiter le risque de récurrence d'AVC.


Pour l'Aspirine et le Clopidogrel : par rapport à votre heure de prise habituelle

- si l'oubli est < 12h : prenez votre médicament et poursuivez votre traitement de manière habituelle
- si l'oubli est > 12h : ne prenez pas votre médicament, prenez la prise suivante comme habituellement SANS doubler la dose


Potentiels effets indésirables

En raison de leur mode d'action, les antiagrégants plaquettaires peuvent provoquer des saignements qui se manifestent par :

- la présence de "bleus" (hématomes)
- des saignements au niveau des gencives ou du nez
- du sang dans les urines ou dans les selles



Ces médicaments peuvent aussi provoquer des troubles digestifs : nausées, douleurs abdominales, ulcères ou saignements digestifs. Pour limiter cela, vous pouvez prendre votre traitement au cours des repas.



Pour l'Aspirine, il peut y avoir des réactions allergiques qui peuvent se manifester par un urticaire, eczéma, œdème, crise d'asthme...

IMPORTANT!

En cas d'apparition inhabituelle d'un de ces signes : contacter votre médecin traitant et en cas d'urgence appeler le SAMU (numéro 15).



Surveillance de mon traitement

- Signalez à tout professionnel de santé que vous prenez un antiagrégant plaquettaire (médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers, podologues, kinésithérapeutes...).
- Précaution à prendre : Eviter les sports ou activités violentes



Interactions



Certains médicaments peuvent interférer avec votre antiagrégant plaquettaire. Avant de prendre un nouveau médicament sans ordonnance, mais aussi des produits à base de plantes, rappelez à votre pharmacien que vous prenez un antiagrégant plaquettaire, pour qu'il vous conseille un médicament qui n'interagisse pas avec celui-ci.

Voici quelques exemples de substances pouvant interagir avec votre traitement, en diminuant son effet (risque d'apparition d'un caillot sanguin) ou en l'augmentant (risque de saignements) :



- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : ibuprofène (ADVIL, NUROFEN, SPIFEN...), diclofénac (FLECTOR, VOLTARENE...), kétoprofène (BI PROFENID, KETUM...)...
- l'aspirine à dose anti-inflammatoire
- le millepertuis (présent dans certains compléments alimentaires, tisanes, huiles végétales)
- le jus de pamplemousse

En cas de questions, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.